“胃瘻の扱い”に困っていませんか？ ～ 胃瘻実技編 ～

利根中央病院
NST専門療法士 NST看護師
戸丸 悟志

本日の目標

胃瘻の確認

トラブルシューティングについて

簡易懸濁法

経腸栄養剤の半固形化

胃瘦の確認

チューブの種類(4種類)

体外ストッパーの位置

胃瘻キットの回転・挿入・抜去

水の交換(バルン型・1 ~ 2W / 回)

皮膚の状態

胃瘻の種類

カテーテルの回転と 外部ストッパーのずらし

クルクル
ピッピッ

バルン水の確認

必ず蒸留水を使おう！！

実技

チューブの種類の確認(4種類)

体外ストッパーの位置の確認

PEGキットの回転・挿入・抜去

バルーンの水交換

皮膚の状態チェック

トラブルシューティング について

アセスメントシート

	/	/	/	/	/
機械的合併症	無・有(対処)	無・有(対処)	無・有(対処)	無・有(対処)	無・有(対処)
PEG周囲の発赤・腫脹	無・有 ()				
出血	無・有 ()				
ストッパーによる皮膚障害	無・有 ()				
バンパー埋没	無・有 ()

症例

- 80歳男性、胃瘻挿入中 チューブ型バンパー
- 胃瘻挿入部より栄養剤の漏れがあり、山田医師に報告したところ、「外部バンパーをもっときつく締めて」と指示された。
- その後も栄養剤の漏れは続き、次第に栄養剤が注入できなくなった。
- この症状とは？

適切な圧の調節(造設初期)

- 術後24時間

腹壁と胃壁が密着するように固定し
癒着を促進

- 術後1日目

バンパー式: 約0.5 ~ 1cm緩める

- 術後3 ~ 4日目

バンパー式: 約1 ~ 2cm緩める

バンパー埋没症候群の予防

(胃粘膜の圧迫壊死, 瘻孔周囲炎, 内部バンパーの埋没)

Buried Bumper Syndrome (バンパー埋没症候群)

適切な管理のカテーテル
(適度な弛み)

締め過ぎによる血流障害が発生

バンパーの埋没の発生

バンパー埋没症候群の完成

症例

- 80歳女性 胃瘻挿入中 ボタン型バンパー
- 1ヶ月前までやせていたが栄養剤注入後より徐々に体重もUPしてきた。
- 注入開始時1cmあそびがあった胃瘻も今はきつい感じに見える。
- ある日、栄養剤の漏れに気づいた。田中医師に相談し、漏れをなくすためさらに短めのシャフトの胃瘻交換を行った。
- その後発赤、ろう孔が開大してきた。

改善策

皮膚を犠牲にしても、胃粘膜を救うのが、
胃瘻のスキンケアの極意！

症例

- 77歳男性 自己抜去の恐れがあるためボタン型のバンパーを挿入した。
- 退院後は在宅へ帰る予定。
- 家族より忙しいのでなるべく注入時間を短くしたいという希望もあり半固形化栄養剤の注入を試みた。
- 注入時の問題点は？

胃瘻の作成にあたり

- インフォームド・コンセント
(誰がどのように管理をするか)
(長期絶食していないか)

患者の生活にあった胃瘻を選択すべき！！

- ボタン型は接続チューブを付けて1人前
(メーカー純正のチューブを使う)
- ボタン型はシャフト長を変えられない
- ボタン型はメーカー名、水の量が書いていない
- チューブ型と違い半固形化栄養剤の注入が困難

実際に注入してみよう！

簡易懸濁法

簡易懸濁法とは

今まで錠剤粉碎・脱カプセルを行っていた処方において、錠剤やカプセルをそのまま約55の温湯20mLに入れて5～10分間自然放置して崩壊・懸濁する方法である。

簡易懸濁法

簡易懸濁法の利点

- 錠剤粉砕時に発生する光・温度・湿度の影響の減少
- 粉砕・分包による薬剤のロスの減少
- 薬剤による経管チューブの閉塞の可能性の低下
- 多剤との混合が10分間だけになることによる配合変化の可能性の低下

書籍紹介

- 内服薬経管投与ハンドブック 第2版
 ~ 簡易懸濁法可能医薬品一覧 ~

Table 1: Summary of drug information

品名・一般名	商品名・会社名	含有量・剤形	性状・服用形態・アルカリの要否等
アイトロール	アイトロール(アムネーザ)	20mg錠	
アイビーディ	アイビーディ(屈臣氏)	100mg錠	白色粉末、錠(134×13.2)
アカルディ	アカルディ(屈臣氏)	125mg錠	白色粉末、錠(12×12)
アキネトン	アキネトン(大塚製薬)	50mg錠	白色
アネホトシ	アネホトシ(大塚製薬)	12mg錠	
アタディーム	アタディーム(大塚製薬)	50mg錠	
アクトス	アクトス(大塚製薬)	15mg錠	
アクトス	アクトス(大塚製薬)	30mg錠	
アザニン	アザニン(大塚製薬)	50mg錠	
アザルマイジック EN	アザルマイジック EN(大塚製薬)	500mg錠	白色粉末
アタシノゾリ	アタシノゾリ(大塚製薬)	125mg錠	白色粉末、錠(12×12)
アジロベック A	アジロベック A(大塚製薬)	40mg錠	
アジロベック	アジロベック(大塚製薬)	20mg錠	
アジロベック	アジロベック(大塚製薬)	100mg錠	
アズダック	アズダック(大塚製薬)	配合剤	

Table 2: Suspension method table

品名	簡易懸濁法		理由	備考
	水100mlに	水100mlに		
アイトロール	○	○	可	50-100、水に可
アイビーディ	○	○	可	50-100、水に可
アカルディ	○	○	可	50-100、水に可
アキネトン	○	○	可	50-100、水に可
アネホトシ	○	○	可	50-100、水に可
アタディーム	○	○	可	50-100、水に可
アクトス	○	○	可	50-100、水に可
アクトス	○	○	可	50-100、水に可
アザニン	○	○	可	50-100、水に可
アザルマイジック EN	○	○	可	50-100、水に可
アタシノゾリ	○	○	可	50-100、水に可
アジロベック A	○	○	可	50-100、水に可
アジロベック	○	○	可	50-100、水に可
アジロベック	○	○	可	50-100、水に可
アズダック	○	○	可	50-100、水に可

注入後の処置

- 経腸栄養剤注入後、白湯注入。
(経腸栄養剤注入前に入れると下痢対策になる)
- カテーテル閉塞予防に酢水充填をする。
(ボタン型はしなくて可)

酢酸水によるチューブ型カテーテル の清潔保持

5ccの酢酸水を
シリンジに充填

小キャップを閉める

酢酸水の注入

カテーテルを
クランプ

クランプしたまま
シリンジをはずす

クランプしたまま
キャップをする

酢酸水の作り方 食用酢 : 水 = 1 : 10

注入後の消毒

水道水で洗浄する。

チャンバーは付着した汚れを十分におとす。

0.01%次亜塩素酸ナトリウムでチャンバー、ルート内部を満たす。

0.01%次亜塩素酸ナトリウムを入れた容器に1時間浸す。

消毒後は？

チャンバー、ルート内の消毒液をできるだけ排出させる。

チャンバー、ルートの周りを拭く。

経腸栄養剤を入れて使用。

自然乾燥は可

点滴型のバッグ製剤

紙縒(こより)とは

- ティッシュをねじのように巻いたもの
- 胃瘻キットの周囲に巻いておくもの
- 何故ティッシュなの？

ブラシによる洗浄

PDNブラシ

50cmと70cmの長さがあり、各1500円で購入できる

実技

簡易懸濁法(4種類)

「こより(紙漉り)」の作成

薬剤注入・酢水充填

栄養剤の半固形化

液体経腸栄養剤の問題点

消化器トラブル

- 下痢
- 便秘
- 腹痛・腹部膨満
- 胃食道逆流（ 誤嚥性肺炎 ）
- 悪心・嘔吐

下痢の成因と原因

栄養剤投与の状況

- 高浸透圧栄養剤（エレンタール、エンテルード、ツインライン等）の投与
- 注入速度が速い、濃度が高い、温度が低い
- 栄養剤、注入バッグ、チューブ等の細菌感染

薬物投与の状況

- 抗生剤、合成抗菌薬の長期投与
- 胃酸分泌抑制剤、消化管運動改善薬、マグネシウム含有薬剤や制酸剤の投与

患者の状態

- 低アルブミン血症による小腸の吸収能低下
- 腸内細菌叢が不均衡

経腸栄養管理のポイント

投与速度

- 腸瘻 100ml/h以下
- 胃瘻 200～300ml/h以下

投与開始時の注意点

- 長期絶食患者にはGFOより開始。その後エレンタールやCZ-hiなど低速で開始する(投与開始は脂肪・蛋白を少なめにする)

下痢の対策

栄養剤の投与

- 高張性から等張性栄養剤に変更する
- いったん100mL/時以下の**低速度**とし、徐々に速度をあげる

抗生剤の投与

- 糞便にてCD toxinが陽性であれば栄養剤・抗生剤投与を中止し、バンコマイシンを内服投与する

低アルブミン血症

- 小腸の吸収能力が回復するまで消化態栄養剤と経静脈栄養を併用する

腸内細菌叢が不均衡

- 食物繊維、オリゴ糖、乳酸菌製剤などを投与する

便秘の原因と対策

栄養剤および水分投与量の不足

- 水分投与量を増やす

薬物投与（麻薬、制酸剤など）

- 原因薬剤を中止する

腸管運動能の低下

- 食物繊維、緩下剤を投与する
- 栄養剤の注入速度を速める

胃食道逆流の機序と原因

一過性LES弛緩

- 高脂肪栄養剤の使用
- 栄養剤の注入速度が速い
- 胃排出能の低下

LES圧低下

- 食道裂孔ヘルニア

腹圧上昇

- 脊柱の弯曲
- 咳や悪心

胃食道逆流の対策

栄養剤

- 脂肪成分を減らす
- 食物繊維を添加する
- 固形化を試みる

栄養剤の投与

- 注入速度を100mL/時以下にする

胃排出能

- 栄養剤注入前に胃内容を吸引する
- 栄養剤注入時の体位を半座位(約30度)とする
- 消化管運動機能改善薬、酸分泌抑制剤を投与する

上記で改善がなければ、経胃瘻的腸瘻 (JETPEG) に変更する。

固形化経腸栄養剤とは？

栄養剤のゲル化（流動性を無くして固化）を行い重力に抗してその
形態が保たれるもの

トロミ剤や粘度増強などによるゲル化ではない！

流動性
なし

流動性
残る

固形化経腸栄養剤の特徴

固形化剤の比較

	粉末寒天	ゼラチン	全卵
安 価			×
入手が容易			
調理が容易			
硬度調節が容易			×
低カロリー			×
粘度を増やさない		×	
体温で溶解しない		×

本日使用する商品

トロミ剤と市販食品の物性マップ

実技

経腸栄養剤の半固形化

半固形タイプの栄養剤の注入

お疲れ様でした。